

ЭНТЕРОСГЕЛЬ

ПОМОГАЕТ ЗАЩИТИТЬ ВСЮ СЕМЬЮ
ОТ СИМПТОМОВ ОТРАВЛЕНИЯ

- Предупреждает и купирует аллергические реакции
- Способствует очищению организма



Как принимать:

Энтеросгель® пасту принимают внутрь за 1-2 часа до или через 1-2 часа после еды или приёма лекарственных препаратов. Необходимое для приёма количество препарата размешать в стакане в тройном объёме воды комнатной температуры или принимать внутрь, запивая водой.



| Возраст | Разовая доза | Суточная доза |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Взрослые | 1-1,5 столовые ложки (15-22,5 г) 3 раза в сутки | 45 - 67,5 г 2 - 3 пакета |
| | 1 столовая ложка (15 г) 3 раза в сутки | 45 г 2 пакета |
| Дети с 5 до 14 лет | 0,5 столовой ложки (7,5 г) 3 раза в сутки | 22,5 г 1 пакет |
| | 0,5 чайной ложки (2,5 г) 6 раз в сутки | |

Производитель: ООО «ТНК СИЛМА» 115573, г. Москва, Шипиловская улица, д. 50, к. 1, стр. 2
Тел./факс: (495) 223-9100 info@enterosgel.ru www.enterosgel.ru Пер. № ЛП-Н (000036) - (РГ-РУ)

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ

ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ¹



Употребление ядовитых ягод, грибов, а также консервированных продуктов на их основе может привести к отравлению.

В случае развития симптомов отравления, следует как можно скорее обратиться к скорой помощи и, ожидая врача, промыть желудок и принять сорбенты (например, Энтеросгель)².

Промывание
желудка (5-6 л
жидкости)

Регидратация
методом пероральной
регидратации и/или
внутривенной
инфузионной терапии

Гастроинтестинальная
сорбция: пероральное
или зондовое введение
в желудок или кишечник
(после интубации)
энтеросорбента³

Доза энтеросорбента составляет 30-50 г, разведённые в 50-100 мл воды. Метод эффективен как в токсикогенной, так и в соматогенной фазе отравления.

При контроле за проводимой регидратационной терапией необходимо учитывать объём мочи больного. Если этот объём за 6 ч > 500 мл, эффект регидратации достигнут. Если объём за 6 ч < 500 мл, темп регидратации необходимо снизить и предпринять исследования для оценки концентрационной и фильтрационной функции почек (измерение удельного веса и осмолярности мочи).



1 Клинические рекомендации «Токсическое действие ядовитых веществ, содержащихся в съеденных грибах» - Министерство Здравоохранения Российской Федерации, с.30-31.

2 «Защитите Свою Семью: Убедитесь в Безопасности Продуктов, Которые Вы Едите!». Профилактика пищевого ботулизма при обработке консервированных пищевых продуктов в домашних условиях. – Всемирная Организация Здравоохранения. с.13.

3 Противопоказанием является парез кишечника, первые 3 суток после операции на желудочно-кишечной тракте.

Горячая линия + 7 495 646 14 33 www.enterosgel.ru

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ