

Риалтрис™

КОНТРОЛЬ НАЗАЛЬНЫХ И ГЛАЗНЫХ СИМПТОМОВ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА С БЫСТРЫМ НАЧАЛОМ ДЕЙСТВИЯ¹

УНИКАЛЬНАЯ* ФИКСИРОВАННАЯ КОМБИНАЦИЯ

ОЛОПАТАДИН

АНТАГОНИСТ H1-ГИСТАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ



МОМЕТАЗОН

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИД



**БЫСТРОЕ НАЧАЛО
ДЕЙСТВИЯ^{1**}**



**КОНТРОЛЬ НАЗАЛЬНЫХ
И ГЛАЗНЫХ СИМПТОМОВ^{1**}**



**БЛАГОПРИЯТНЫЙ ПРОФИЛЬ
БЕЗОПАСНОСТИ^{1***}**



**РАЗРЕШЕН К ПРИМЕНЕНИЮ:
6+ ПРИ САР / 12+ ПРИ КАР¹**



САР — сезонный аллергический ринит (АР), КАР — круглогодичный АР

* По данным ГРЛС на 17.02.2023 <https://grls.rosminzdrav.ru/>

** Продemonстрировано в клинических исследованиях:

- Patel P, Salapatek AM, Tantry SK. Effect of olopatadine-mometasone combination nasal spray on seasonal allergic rhinitis symptoms in an environmental exposure chamber study. Ann Allergy Asthma Immunol. 2019; 122: 160-166.

- Hampel F.C. et al. Olopatadine-mometasone combination nasal spray: Evaluation of efficacy and safety in patients with seasonal allergic rhinitis // Allergy Asthma Proc. 2019 Jul 3; 40 (4): 261-272.

- Gross GN, Berman G, Amar NJ, Caracta CF, Tantry SK (2019). Efficacy and safety of olopatadine-mometasone combination nasal spray for the treatment of seasonal allergic rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol; 122(6):630-8.

*** Продemonстрировано в клиническом исследовании:

Segal I, Prenner B, Lumry W, Caracta CF, Tantry SK. Long-term safety and efficacy of olopatadine-mometasone combination nasal spray in patients with perennial allergic rhinitis. Allergy Asthma Proc. 2019

Sep 1;40(5):301-310. doi: 10.2500/aap.2019.40.4233. Epub 2019 Jun 27. PMID: 31248471.

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Риалтрис РУ № ЛП-006768 от 09.02.21. Доступно на www.grls.rosminzdrav.ru

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА РИАЛТРИС

Противопоказания: Препарат Риалтрис противопоказан к применению у пациентов с гиперчувствительностью к мометазону сульфату, олопатадина гидрохлориду или к любому из вспомогательных веществ; недавнее оперативное вмешательство или травма носа с повреждением слизистой оболочки носовой полости - до заживления раны (в связи с замедляющим действием ГКС на процесс заживления); беременность, период грудного вскармливания; наличие нелеченной местной инфекции с вовлечением в процесс слизистой оболочки носовой полости, например, вызванной Herpes simplex; детский возраст до 6 лет при САР, до 12 лет при КАР. С осторожностью: Препарат следует применять с осторожностью при туберкулезной инфекции (активной и латентной) респираторного тракта, нелеченой грибковой, бактериальной, системной, вирусной инфекции или инфекции, вызванной Herpes simplex с поражением глаз (в виде исключения возможно назначение препарата при перечисленных инфекциях по указанию врача). После применения препарата Риалтрис следует воздержаться от участия в опасных видах деятельности, требующих усиленной концентрации внимания и координации движений, таких как работа с механизмами или вождение транспортного средства. Побочное действие: В клинических исследованиях наиболее частыми нежелательными реакциями при применении препарата Риалтрис (1% и выше, чем в группе плацебо) были инфекции верхних дыхательных путей, носовое кровотечение, головная боль, дискомфорт в носу, вирусные заболевания верхних дыхательных путей, инфекция мочевыводящих путей, кашель и дисгевзия.

Информационный материал для специалистов здравоохранения

№RUS-RLT-003_02-2023

ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ПРЕПАРАТА РИАЛТРИС, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

glenmark

ООО «Гленмарк Импэкс» Россия, 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, БЦ «Вивальди Плаза»
Тел./Факс 7 499 951 00 00 www.glenmarkpharma.com / www.glenmark-pharma.ru